



VERSTOPFUNG WEG! GLYCERIN-MINIKLISTIERE FÜR KINDER AB 2 JAHREN

3,4 g Glycerin

Medizinprodukt zur Einmalanwendung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie diese Glycerin-Miniklistiere verwenden. Verwenden Sie diese Mini-Klistiere wie angegeben und folgen Sie die Empfehlungen dieser Gebrauchsinformation. Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den Fall auf, dass Sie sie erneut lesen möchten.

Produktbeschreibung: Das Miniklistier (Mini-Einlauf) ist ein Einmal-Medizinprodukt auf Glycerinbasis zur rektalen Anwendung. Das Miniklistier wird als weiche Kunststofftube geliefert, die mit einer Kanüle mit perforierter Oberseite versehen und mit einer Kappe verschlossen ist. Die Verschlusskappe muss vor dem Gebrauch entfernt werden.

Zusammensetzung: 1 Miniklistier enthält 3,4 g Glycerin, gereinigtes Wasser. Das Gesamtgewicht einer Tube beträgt 6,0 g.

Wann sollte das Glycerin-Miniklistier verwendet werden: Glycerin-Miniklistiere werden zur symptomatischen Behandlung von Verstopfung, zur Erleichterung der Darmentleerung bei hartem Stuhl oder vor Durchführung einer Rektoskopie eingesetzt. Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung des Mini-Klistiers und die Hinweise aus diesem Merkblatt. Für den sicheren Gebrauch dieses Medizinproduktes fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wirkung des Glycerin-Miniklistiers

Sorgt für eine Gleitwirkung im Darmtrakt und erleichtert die Ausscheidung von Fäkalienmasse. Die Wirkungsweise wird durch die Eigenschaften der hochkonzentrierten Glycerinlösung gewährleistet. Nach der rektalen Verabreichung entzieht die hyperosmotische Lösung den Geweben und Schleimhäuten des Dickdarms Wasser und erhöht so das Volumen des Darminhalts. Dies führt zu einer Entspannung der Darmwände, und somit zu einer sanften und mühelosen Entleerung durch einen fast normalen Vorgang.

Verwenden Sie das Glycerin-Klistier nicht:

Bei Bauchschmerzen oder Schmerzen unbekannter Ursache. Nicht verwenden bei entzündlichen Darmerkrankungen wie: Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Krämpfen oder Koliken. Vermeiden Sie die Anwendung bei Übelkeit, Erbrechen oder blutigem Stuhl.

Nebenwirkungen:

Bei Menschen, die zuvor über eine Wunde oder eine gereizte Rektumschleimhaut geklagt haben, können Nebenwirkungen auftreten. Falls irgendwelche Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. In sehr seltenen Fällen können nach längerer Anwendung von Glycerin-Miniklistieren lokale Nebenwirkungen auftreten (Brennen).

Dosierung: Glycerin-Miniklistiere für Kinder: Die empfohlene Dosis beträgt 1 Miniklistier pro Tag oder nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers.

Wie man das Glycerin-Miniklistier verabreicht:

Die Verabreichung erfolgt durch einen Erwachsenen, während sich das Kind in Bauchlage befindet. Entfernen Sie den Verschluss der Tube vor Gebrauch. Schmieren Sie die Tubenspitze mit einigen Tropfen des Miniklistiers ein und führen Sie diese dann vorsichtig durch den After in den Enddarm ein, bei Kindern unter 6 Jahren sollte die Tube bis zur Hälfte eingeführt werden.

Durch Drücken der flexiblen Tube wird der Inhalt langsam und einfach in den Enddarm gedrückt, bis dieser sich entleert hat. Entfernen Sie das Miniklistier, während Sie die Tube gedrückt halten, und werfen Sie sie dann weg. In den meisten Fällen tritt die Wirkung sofort oder nach 10-15 Minuten ein.

Für Kinder unter 6 Jahren: Wenn das Stuhlganggefühl auftritt, sollten Sie Ihr Kind auf das Töpfchen bzw. auf die Toilette setzen. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Bei Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren: sprechen Sie zuvor mit Ihrem Kinderarzt.

Das Miniklistier ist als Einzelanwendung für eine einfache und risikolose Anwendung konzipiert worden. Diese Glycerin-Miniklistiere stellen nur ein Hilfsmittel im Rahmen einer hygienischen und diätetischen Behandlung dar. Um die Darmfunktion zu normalisieren, ergänzen Sie die Ernährung Ihres Kindes mit Ballaststoffen, Flüssigkeit und ermutigen Sie es zu körperlicher Aktivität.

Das Produkt ist wie folgt verpackt: 1 Packung mit 6 Miniklistieren, à 6,0 g pro Tube.

Lagerbedingungen: Die Miniklistiere müssen in der Originalverpackung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % und Temperaturen zwischen 5 - 25 °C aufbewahrt werden.



Warnungen: NUR ZUR INTRAREKTALEN VERABREICHUNG! VON KINDERN FERN HALTEN! NICHT NACH DEM AUF DER VERPACKUNG ANGEZEIGTEN ABLAUFDA-TUM VERWENDEN!

Das Produkt darf nicht gleichzeitig mit anderen Abführmitteln angewendet werden, unabhängig vom Verabreichungsweg. Verwenden Sie die Glycerin-Miniklistiere nicht über einen längeren Zeitraum.

Die Verstopfungsbehandlung darf den Zeitraum von 10 Tagen nicht überschreiten.

Wenn sich die Symptome in diesem Zeitraum nicht verbessern oder gar verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie an einer Darmerkrankung oder Erkrankung des Rektums (Hämorrhoiden, Analissenen, etc.) leiden, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Glycerin-Miniklistiere verwenden.

Datum, an dem diese Gebrauchsanweisung zuletzt überarbeitet worden ist: Juli 2021.



Vertrieb: doc kinderlabor
guterrat Gesundheitsprodukte
Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck
doc@guterrat.net



Hersteller:
S.C. EMINVEST PHARMACEUTICALS S.R.L.
Str. Ciorogăria, nr. 145, loc. Băcu, jud. Giurgiu, RO.
office@eminvest.ro - www.eminvest.ro

